

Lidocaine & Prilocaine 外用噴霧劑

主成份	商品名	中文商品名	含量
Lidocaine & Prilocaine	Fortacin Cutaneous Spray	賦久勁外用噴霧劑	Lidocaine 150 毫克/毫升 & Prilocaine 50 毫克/毫升，5 毫升/瓶

作用：

治療成年男性之原發性早發性射精。

劑量與用法：

需要時按 3 下（1 劑＝按 3 下）使藥劑覆蓋於龜頭（龜頭應完全退去包皮），每按一下需覆蓋三分之一的龜頭。5 分鐘後，應在性交前抹掉多餘藥液。

24 小時內最多可給予 3 劑，每一劑相隔至少 4 小時。每瓶最少可送出 12 劑。

在第一次使用前短暫搖晃噴霧器，然後朝空中噴三次，以完成準備作業。往後每次使用前，應短暫搖晃噴霧器，然後噴一次以重新完成準備作業。

注意事項：

1. 病人或其伴侶若患有 G6PD 缺乏症、先天性或特發性變性血紅素血症 (congenital or idiopathic methaemoglobinaemia)，較易發生藥品誘發性變性血紅素血症，須小心使用。
2. 避免接觸眼睛，可能引起眼部刺激。若不慎接觸眼睛，請立即以水或氯化鈉溶液清洗眼睛，並保護眼睛直到感覺恢復為止。
3. 若噴到病人或其伴侶的黏膜，例如口腔、鼻和喉嚨黏膜，或接觸女性生殖器或肛門黏膜，很可能發生暫時性局部麻木/麻醉。此感覺減弱現象可能遮蔽正常痛覺，因此增加局部受傷的危險。
4. 由於有轉移至伴侶身上的風險，期望受孕的病人應避免使用 Fortacin，或者如欲作性器接合，應在噴上噴霧 5 分鐘後但從事性交前，盡可能徹底洗淨龜頭。

此藥可能引起的副作用有哪些？如果發生了該怎麼辦？

症狀	如何處理
生殖器感覺減弱、勃起功能障礙、陰戶陰道灼熱感	症狀持續，則應告知醫師（尤其是症狀持續且嚴重時）

藥品該如何存放？

原包裝 24 個月，開封首次使用後 12 週。