

輝瑞新冠口服藥 Paxlovid Nirmatrelvir and Ritonavir 錠

主成份	商品名	中文商品名	含量
Nirmatrelvir & Ritonavir	Paxlovid Tablets	倍拉維膜衣錠	Nirmatrelvir 150 毫克/錠 & Ritonavir 100 毫克/錠

作用：

本藥適用於新型冠狀病毒(COVID-19)感染發病 5 天內、具有重症風險因子*之成人或兒童(12 歲以上且體重至少 40 公斤)的輕症病人。

*重症風險因子請見衛福部公費 COVID-19 治療用口服抗病毒藥物領用方案建議

使用的限制

- 本藥尚未被核准用於新冠病毒的暴露前或暴露後的預防治療。
- 本藥未被核准連續使用超過 5 天。

劑量與用法：

請務必依照醫師指示服用，持續服藥五天。

通常為每日二次，每次 3 錠(2 錠粉色+1 錠白色藥錠)。

可隨餐或空腹服用。



腎功能不良病人用藥指示請先詢問醫師或藥師。

注意事項：

- 如果您有以下情況，請告訴您的醫療照護提供者：
 - 有任何過敏
 - 有肝臟或腎臟方面的疾病
 - 已經懷孕或計劃要受孕
 - 正在母乳哺餵孩子
 - 有任何嚴重的疾病
- 請將所有您使用中的藥物告知您的醫療照護提供者，包括處方藥物、非處方藥物、維生素和草藥類補充劑。

本教育單張並未包含所有的藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師

有些藥物可能與本藥產生交互作用並可能會導致嚴重的副作用。請列出您的藥物清單，以便在您取得新的藥物時，向您的醫療照護提供者和藥師出示。

如果您正在使用以下任何一種藥物：請勿服用本藥。

- Alfuzosin、silodosin
- Dextropropoxyphene
- Ranolazine
- Amiodarone、dronedarone、flecainide、propafenone、quinidine
- Colchicine
- Lurasidone、pimozide
- Dihydroergotamine、ergotamine、methylergonovine
- Lovastatin、simvastatin
- 用於肺動脈高壓 (PAH) 的 sildenafil
- Finerenone
- Triazolam、口服 midazolam
- Apalutamide
- Carbamazepine、phenobarbital、phenytoin
- Rifampin、rifapentine
- 聖約翰草 (St. John's Wort)

3. 如果您對本藥中的任何成分過敏，請勿服用本藥。

4. 即使您感覺好多了，請勿在沒有和您的醫療照護提供者討論的情況下停止服用本藥。

忘記用藥時該怎麼辦？

如果您忘記服用本藥，一旦您記起來的時間為 8 小時內就請立即服用它(如平時為早、晚 9 點服藥，17 點前想起早上忘記服藥)。如果您忘記服藥超過 8 小時，請跳過忘記的劑量，並在您例行的時間服用下一劑(如平時為早、晚 9 點服藥，17 點後才想起早上忘記服藥，只要服用晚上 21 點的藥即可)。請勿同時服用兩倍劑量。

此藥可能引起的副作用有哪些？如果發生了該怎麼辦？

症狀	如何處理
味覺改變、腹瀉、高血壓、肌肉疼痛等	請告知醫師，尤其是症狀持續且嚴重時
異常疲倦、虛弱、食欲不振、嚴重噁心嘔吐、皮膚或眼部變黃、淺色糞便、尿液顏色變深	如果您有左列任何肝臟問題的徵兆和症狀，請立即告知您的醫療照護提供者

藥品該如何存放？

宜儲存於 15-30°C，並請參考藥袋說明。

剩餘藥品如何處理？

請依居家隔離廢棄物處理，勿隨意丟棄。