

Molnupiravir 膠囊

主成份	商品名	中文商品名	含量
Molnupiravir	Lagevrio Capsule	無(默沙東新冠口服藥)	200 毫克/膠囊

作用：

本藥為一專案核准輸入藥品，適用於發病五天內、具有重症風險因子之成人輕度至中度新冠肺炎確診者，且臨床上不適用其他新冠病毒治療選擇時。

*重症風險因子請見衛福部公費 COVID-19 治療用口服抗病毒藥物領用方案建議

使用的限制

- 本藥並未被核准用於 18 歲以下的病人。且本藥不建議用於懷孕婦女。
- 本藥並未被核准用於因患新冠疾病而必須住院接受照護之病人。
- 本藥並未被核准可連續使用超過 5 天。
- 本藥並未被核准用於接觸新冠病毒確診者前或接觸後的預防性治療。

劑量與用法：

請務必依照醫師指示服用，持續服藥五天。

通常為每日二次，一次 4 顆膠囊 (每次 800 毫克)。

可隨餐或空腹服用。

➤ 無法口服且有用藥需求之病患，請參考口服懸浮液配置建議

Molnupiravir尚未取得中央衛生主管機關核准之藥品許可證，為依據藥事法第48條之2，因應緊急公共衛生情事之需要，經專案核准輸入使用，非經一般核准(regular approval)程序。

無法口服且有用藥需求之病患，口服懸浮液配置建議

免責聲明：利用口服懸浮劑方式給予病患molnupiravir的效用並未在臨床試驗中評估，原始試驗中的投予方式為每12小時口服一次。根據第二期臨床試驗(MOVE-IN/MK-4482-001)的資料，僅有五位受試者利用鼻胃管/口胃管投予molnupiravir，且molnupiravir中文說明書中並不推薦該方式給予藥物

以下請詳見臨床試驗(MOVE-IN/MK-4482-001)中利用鼻胃管/口胃管投予molnupiravir的藥物配置方法：

1 打開四顆膠囊並將內容物置於調製杯或注射器中

2 加入40 毫升的水

3 將膠囊內容物與水均勻混合/攪拌3分鐘
配置完畢請盡快投予病人服用
根據此份手冊配置的重組懸浮液劑可能含有肉眼可見的未溶解懸浮物質，仍可作為口服使用

注意事項

建議應在懸液劑配置完成後，最晚一小時內盡快給予病人

若非配置完畢立即投予，給予前須重新均勻混和口服懸液劑一分鐘，可額外再給予水分確保所有藥物容攝完成，水量上限為240毫升

注意事項：

1. 如果您有以下情況，請告訴您的醫療照護提供者：

- 有任何過敏
- 已經懷孕或計劃要受孕

本單張並未包含所有的藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師

- 正在母乳哺餵孩子
 - 有任何嚴重的疾病
 - 正在使用其他藥物(包含處方藥、非處方藥、保健食品等)
2. 即使您感覺好多了，請勿在沒有和您的醫療照護提供者討論的情況下停止服用本藥，務必完成五天療程。
 3. 建議您在服用本藥時使用有效的阻隔避孕法或不進行性行為；女性應避孕至停藥後 4 天、男性則應至少避孕至停藥後 3 個月。

忘記用藥時該怎麼辦？

如果您忘記服用本藥，一旦您記起來的時間為 10 小時內就請立即服用它(如平時為早、晚 9 點服藥，19 點前想起早上忘記服藥)。如果您忘記服藥超過 10 小時，請跳過忘記的劑量，並在您例行的時間服用下一劑(如平時為早、晚 9 點服藥，19 點後才想起早上忘記服藥，只要服用晚上 21 點的藥即可)。請勿同時服用兩倍劑量。

此藥可能引起的副作用有哪些？如果發生了該怎麼辦？

症狀	如何處理
腹瀉、噁心、暈眩	請告知醫師，尤其是症狀持續且嚴重時

藥品該如何存放？

宜儲存於 15~30°C，並請參考藥袋說明。

剩餘藥品如何處理？

剩餘藥品請依居家隔離廢棄物處理，勿隨意丟棄。