

Darolutamide 錠

主成份	商品名	中文商品名	含量
Darolutamide	Nubeqa F.C. Tablet	諾博戈膜衣錠	300 毫克/錠

作用：

適用於治療非轉移性的去勢抗性(castration-resistant)前列腺癌病人。

劑量與用法：

一天兩次，伴隨食物服用。請整粒吞服，不可剝半或磨粉。

醫師可能會調整您的劑量，請依照醫囑服用。

注意事項：

1. 本藥品治療期間須定期監測療效與副作用，請依照醫囑定時回診。
2. 如您和您的伴侶有生育計劃，請事先告知醫師。
3. 服藥期間至最後一劑的一周內應採取有效避孕措施，避免生育年齡伴侶懷孕。副藥期間如果伴侶懷孕請盡快告知醫師。
4. 若有肝臟或腎臟病史請告知醫師。
5. 若有服用任何藥物，包含西藥、中草藥、保健食品，請告知開方醫師。治療期間新增或停止任何藥物也請告知醫師。

忘記用藥時該怎麼辦？

想起時盡快補服；若已接近下次服藥時間則不用補服，依照原來時間原劑量服用。千萬不可一次服用兩倍劑量。

此藥可能引起的副作用有哪些？如果發生了該怎麼辦？

症狀	如何處理
過敏症狀(皮膚癢疹、蕁麻疹、口腔或咽喉刺痛腫脹、呼吸異常)、發燒或感染症狀如喉嚨痛、排尿困難或疼痛	請立即（盡速）就醫
四肢痠痛、疲倦	請告知醫師，尤其是症狀持續且嚴重時

藥品該如何存放？

20-25°C 室溫儲存。可容許短時間 15-30°C。避開兒童可取得之處。