

| 主成份        | 商品名                         | 中文商品名  | 含量       |
|------------|-----------------------------|--------|----------|
| Ribociclib | Kisqali Film-Coated Tablets | 擊癌利膜衣錠 | 200 毫克/錠 |

作用：

治療乳癌。

劑量與用法：

1. 請依照醫師指示按時服用，請勿自行增減藥量或任意停藥。
2. 每天固定時間服用。請整粒吞服，勿咬碎或剝半。

注意事項：

1. 此藥品可能與其他抗癌藥品一同開立，藥量會依據副作用嚴重度而調整，請循醫師指示服藥。
2. 可能造成白血球及血小板低下、肝功能指數異常，請配合醫師定期回診檢查。
3. 注意個人衛生，避免與有傳染病的人接觸，如有任何感染症狀請立即就醫。避免受傷或意外碰撞造成的瘀血或出血。
4. 可能對胎兒造成傷害，有懷孕計畫或已經懷孕的婦女請務必告知醫師，女性於治療期間至治療完成三周內需採去有效的避孕措施，亦應避免授乳。男性於治療期間至治療完成後三個月內也需避孕。
5. 可能會與其他藥物產生交互作用，請告知醫師正在使用的藥品，治療期間如有新增或停用任何藥品也請告知醫師。
6. 避免食用葡萄柚、石榴或飲用葡萄柚汁、石榴汁。

忘記用藥時該怎麼辦？

想起時儘快補服，若已接近下次服藥時間就不用補服，按原來時間服用下一次劑量，千萬不可一次服用兩倍的劑量。

此藥可能引起的副作用有哪些？如果發生了該怎麼辦？

| 症狀                                                                                      | 如何處理              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 心律不整、過敏反應(蕁麻疹，臉或手腫脹，嘴或喉嚨腫脹或刺痛，胸悶，呼吸困難)、發燒、感染、出血、暈眩、胸痛、呼吸急促、黑尿、大便蒼白皮膚或眼睛發黃、乾咳或其他肺部相關症狀加劇 | 請立即（盡速）就醫         |
| 疲倦、食慾不振、噁心、嘔吐、胃痛、便秘、腹瀉、落髮、背部或關節疼痛                                                       | 請告知醫師，尤其是症狀持續且嚴重時 |

藥品該如何存放？請參考藥袋說明。

本教育單張並未包含所有的藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師