

Talazoparib Tosylate 膠囊

主成份	商品名	中文商品名	含量
Talazoparib Tosylate	Talzenna Capsules	達勝癌膠囊	0.25 毫克/膠囊

作用：

達勝癌膠囊單一療法適用於治療曾接受前導性、術後輔助性或轉移性化療，或無法接受化療，且具生殖細胞 BRCA 1/2 (germline BRCA 1/2) 突變併 HER2 陰性之局部晚期或轉移性乳癌成年病人。

劑量與用法：

1. 一般起始劑量為每天一次，每次 1 毫克（4 顆 0.25 毫克膠囊），隨餐或空腹服用。劑量可能因腎功能而調整至您適合的藥量，請依照醫囑服用。
2. 應持續服用至直到病情惡化或發生無法接受的毒性為止。醫師會依據副作用嚴重度及臨床症狀中斷治療或調降劑量，請遵照醫囑服用。
3. 本硬膠囊應整粒吞服，請勿打開或溶解。

注意事項：

1. 本藥品可能對胚胎及胎兒產生傷害，男性可能產生生育能力障礙，如有生育計劃，請在使用該藥品之前諮詢醫師。建議女性於治療期間和最後一劑後至少一個月不應哺乳，於治療期間和最後一劑後至少七個月應使用有效避孕措施，男性於治療期間和最後一劑後至少四個月應使用有效避孕措施。
2. 如有腎臟疾病、肝臟疾病、血液或骨髓方面的問題，請告知醫師。
3. 使用本藥品可能發生骨髓抑制，若因先前化療造成血液學毒性，請告知醫師，並依照醫囑定期回診追蹤。
4. 如有服用其他藥物、中草藥、保健食品，請告知醫師。如果需要新增其他藥物，或施打疫苗，請告知醫師。

忘記用藥時該怎麼辦？

如果發生嘔吐或漏服一劑藥物，不應服用額外劑量，應依正常時間服用下一個處方劑量。

此藥可能引起的副作用有哪些？如果發生了該怎麼辦？

症狀	如何處理
過敏反應：瘙癢或蕁麻疹、臉部或手部腫脹、口腔或喉嚨腫脹或刺痛、胸悶、呼吸困難。異常出血、瘀青或虛弱、血尿或血便。骨頭疼痛。感染症狀：發燒、畏寒、咳嗽、	若發生以上副作用，請盡速就醫

本教育單張並未包含所有的藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師

喉嚨痛、全身痠痛	
食慾下降、胃痛、掉髮、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐、腹瀉	若發生這些較不嚴重的副作用，請告知醫師

藥品該如何存放？

儲存於室溫 20-25 °C，可容許短時間 15-30 °C。

NTU