

Midostaurin 軟膠囊

主成份	商品名	中文商品名	含量
Midostaurin	Rydapt Soft Capsule	療德妥軟膠囊	25 毫克/軟膠囊

作用：

於新確診為 FLT3 突變陽性的急性骨髓性白血病(AML)成人病患之標準前導(daunorubicin 併用 cytarabine)與鞏固性化療(高劑量 cytarabine)時合併使用 Rydapt。

劑量與用法：

1. 每日口服二次，間隔 12 小時，應與食物併服。醫師可能因病情調整劑量，請依照醫囑服用。
2. Rydapt 膠囊需配一大杯水整粒吞服。不應打開、折斷或咀嚼 Rydapt 膠囊。

注意事項：

1. 建議有性生活且具生育能力的女性，在開始 Rydapt 治療前，先進行懷孕檢測。具生育能力的男性或女性在服用 Rydapt 期間和治療停止後至少 4 個月內，應採用避孕。
2. 在治療期間及治療停止後至少 4 個月內，避免哺乳。
3. 避免食用含有葡萄柚的相關食品/產品。
4. 在使用其他保健食品/中草藥之前請先諮詢醫師或藥師。

忘記用藥時該怎麼辦？

如果錯過某次劑量，請勿補服該劑量，病人應於下次排定時間服用下一次排定劑量。

如果服藥後嘔吐，則不應服用額外的 Rydapt 劑量。

此藥可能引起的副作用有哪些？如果發生了該怎麼辦？

症狀	如何處理
過敏反應(例如：搔癢、蕁麻疹)、臉/手腫脹、嘴巴/喉嚨腫脹刺痛、胸悶、呼吸困難、視力改變	請立即（盡速）就醫
便秘、腹瀉、噁心/嘔吐、頭痛、肌肉/關節痛、流鼻血、頭暈	請告知醫師，尤其是症狀持續且嚴重時

藥品該如何存放？

30°C 以下儲存 3 年。請參考藥袋說明。

本教育單張並未包含所有的藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師