

主成份	商品名	中文商品名	含量
Osimertinib	Tagrisso Film-coated Tablets	泰格莎膜衣錠	80 毫克/錠

作用：

1. 具表皮生長因子受體(EGFR)突變之局部侵犯性或轉移性非小細胞肺癌(NSCLC)病人的第一線治療。
2. 治療具有 EGFR T790M 基因突變之局部侵犯性或轉移性非小細胞肺癌(NSCLC)在酪胺酸激酶抑制劑(EGFR TKI)治療期間或之後疾病惡化的病人。

劑量與用法：

1. 一般狀況為每天一次，每次使用一顆，每天固定時間服用。醫師可能會依據病情調整您的治療，請依照醫師指示服用。
2. 藥錠不可剝半亦不可磨粉：
 - (1)若有吞嚥困難者，處置方式如下：
將錠劑置於約 50 毫升非碳酸水中，攪拌直到錠劑崩散後立即喝下。
製備期間不要壓碎、加熱或用超音波震碎。再以 120-240 毫升水沖洗容器後立即喝下。
 - (2)若使用鼻胃管餵食者，處置方式如下：
將錠劑崩散於 15 毫升非碳酸水中，另以 15 毫升的開水沖洗殘餘藥並移至灌食空針，將 30 毫升的藥品液體依鼻胃管使用說明進行給藥，再以適量的開水沖洗管道。

注意事項：

1. 避孕：因藥物可能對胚胎造成傷害，女性服藥者請於用藥期間及停藥後至少六周做好避孕，男性服藥者請於用藥期間及停藥後至少四個月做好避孕。
2. 哺乳：若有哺乳需求者，請先與醫師進行討論。
3. 任何保健食品及中草藥及非處方藥品：使用前請先諮詢醫師意見。
4. 請告知每位看診醫師自己有使用泰格莎膜衣錠。

忘記用藥時該怎麼辦？

若錯過一劑泰格莎膜衣錠，請勿補服錯過的劑量，並按照服藥時間表服用下一劑。

此藥可能引起的副作用有哪些？如果發生了該怎麼辦？

症狀	如何處理
腹瀉、口腔發炎、皮膚疹、眼睛紅腫、心跳異常	請告知醫師，尤其是症狀持續且嚴重時
呼吸困難、視力異常、暈眩暈倒、四肢水腫、嚴重過敏(如：皮膚脫皮起水泡)、發燒疑似感染	請立即就醫

藥品該如何存放？

儲存於 25°C 以下之鋁箔盒裝內。

NTU