

Oxybutynin Hydrochloride 擦劑

主成份	商品名	中文商品名	含量
Oxybutynin Hydrochloride	Apohide Lotion	安薄汗擦劑	192 毫克/毫升 4.5 毫升/瓶

作用：

適用於 12 歲以上之原發性手掌多汗症病人。

劑量與用法：

每日睡前一次，塗抹於雙手手掌上。

建議劑量為按壓 5 下（約 96 毫克/日）。

注意事項：

1. 睡前在手掌上塗抹本藥後，應避免弄濕雙手，以免將藥品洗掉。
2. 塗抹過藥品的雙手不得觸碰非塗抹部位（如眼睛）。如果在塗抹過程中藥液進入眼睛，必須立即用水沖洗。
3. 塗抹本藥後，手掌不得穿戴密閉式材質，如氣密手套。
4. 若長期使用，建議定期監測全血球計數及肝臟功能。

忘記用藥時該怎麼辦？

想起時儘快塗藥，若已接近下一次用藥時間則略過一次，依照原定時間用藥，絕不可一次使用兩倍劑量。

此藥可能引起的副作用有哪些？如果發生了該怎麼辦？

症狀	如何處理
用藥部位表皮脫屑、濕疹、水泡、發紅等，未明原因出血、便秘或腹脹、口乾等	症狀持續且嚴重時，請停藥並告知醫師。
視力障礙、心搏過速、尿液滯留、瞳孔放大	請停藥並盡速就醫

藥品該如何存放？

請參考藥袋說明。