

主成份	商品名	中文商品名	含量
Pitolisant	Wakix Film-coated Tablets	唯醒膜衣錠	17.8 毫克/錠

作用：

治療成人猝睡症(伴隨或未伴隨猝倒現象)。

劑量與用法：

1. 本藥通常在早晨醒來時服用。
2. 醫師可能依據您的情況調整使用劑量，請遵照醫師處方按量按時服用，勿擅自停藥。
3. 味道苦澀，若剝半或磨粉可搭配食物服用。

注意事項：

1. 如果您懷孕或哺乳，或者有腎臟疾病、肝臟疾病或心律問題（包括心律不整、心跳緩慢），請告訴您的醫生。
2. 當您使用 pitolisant 時，可能導致避孕藥失去作用。若需避孕，請在治療期間和最後一次服藥後至少 21 天內使用其他避孕方法。
3. 有些藥物會與 pitolisant 有交互作用。如果您正在使用以下任何一種，請告訴您的醫生：
 - ✓ Carbamazepine, cyclosporine, midazolam, moxifloxacin, phenytoin, rifampin
 - ✓ 避孕藥
 - ✓ 治療過敏的藥物 (如: diphenhydramine, pheniramine maleate, promethazine)
 - ✓ 治療抑鬱症的藥物 (如: bupropion, clomipramine, fluoxetine, imipramine, mirtazapine, paroxetine)
 - ✓ 治療心律問題的藥物 (如: amiodarone, disopyramide, procainamide, quinidine, sotalol)
 - ✓ 治療精神疾病的藥物 (如: chlorpromazine, thioridazine, ziprasidone)

忘記用藥時該怎麼辦？

想起時儘快補服，若已接近下次服藥時間就不用補服，按原來時間服用下一次劑量，千萬不可一次服用兩倍的劑量。

此藥可能引起的副作用有哪些？如果發生了該怎麼辦？

症狀	如何處理
過敏反應：瘙癢或蕁麻疹、面部或手部腫脹、口腔或喉嚨腫脹或刺痛、胸悶、呼吸困難	請立即就醫。
快速、劇烈或不均勻的心跳、頭暈或昏厥	請立即就醫。
頭痛、噁心、睡眠困難	請告知醫師，尤其是症狀持續且嚴重時

藥品該如何存放？

儲存於 25°C 以下，遠離熱源、濕氣和直射光。

請參考藥袋說明。

