㊽

Lanthanum Carbonate 錠劑

主成份	商品名	中文商品名	含量
Lanthanum Carbonate	Fosrenol Chewable Tablet	福斯利諾咀嚼錠	750 毫克/錠

作用：

治療末期腎臟疾病患者之高磷酸血症。

劑量與用法：

1. 遵照醫師處方按量按時服用。
2. 不可整粒吞服，錠劑必須咬碎。隨餐或餐後立即使用。

注意事項：

1. 藥物需隨餐服用，服藥後可能會出現腹痛、便秘、腹瀉、噁心等症狀。
2. 已知與制酸劑有交互作用的藥品，應與福斯利諾錯開 2 小時以上服用。
3. 定期回診與監測。

忘記用藥時該怎麼辦？

立即補服但若已接近下次用餐時間，就跳過忘記服用的劑量，等到下次用正餐時才服用一般的劑量，不可服用兩倍的劑量。

此藥可能引起的副作用有哪些？如果發生了該怎麼辦？

症狀	如何處理
皮膚癢或出現蕁麻疹、臉或嘴巴喉嚨腫脹、呼吸困難	可能是過敏反應；儘速告知醫師
腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐、便秘、背痛或關節痛	症狀持續，則應告知醫師
洗腎用人工血管阻塞(每日劑量大於 3 克)	儘速告知醫師

藥品該如何存放？

室溫儲存，避免潮濕。

此教育單張並未包含本藥所有的藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。